

次の病気に罹った方(既往)もしくは治療中の方は、骨髄採取によりあなた自身健康に影響を与えたり、もしくは、移植後に患者さんに影響を与える可能性があります。

そのため、骨髄バンクでは、次の病気に該当する方の骨髄提供は差し控えさせていただきます。何卒、ご理解の程お願い申し上げます。

【循環器疾患】

下肢静脈瘤	下肢静脈瘤の既往のあるもの
先天性心疾患	以下の先天性疾患は、無症状、自然閉鎖、治療の必要がない場合、既往のある場合も含まれる <ul style="list-style-type: none"> ・心房中隔欠損症(ASD) ・心室中隔欠損症(VSD) ・動脈管開存症(PDA) (ボタロー管開存症)
	以下の疾患 (既往歴含む) <ul style="list-style-type: none"> ・心内膜床欠損症 ・大動脈縮窄症 ・完全大血管転位症 ・三尖弁閉鎖症 ・総肺静脈還流異常症 ・単室症 ・純型肺動脈閉鎖症 ・左心低形成症候群
後天性心疾患	以下の疾患 (既往歴含む) <ul style="list-style-type: none"> ・僧帽弁狭窄症(MS) ・僧帽弁閉鎖不全症(MR) ・非リウマチ性僧帽弁閉鎖不全症 ・僧帽弁逸脱症候群 ・大動脈弁狭窄症(特発性大動脈弁下狭窄(IHSS-肥大型閉鎖心筋症)、大動脈弁上狭窄、大動脈下狭窄) ・大動脈弁閉鎖不全症(AR) ・三尖弁狭窄症 ・三尖弁閉鎖不全症 ・連合弁膜症 <ul style="list-style-type: none"> 僧帽弁狭窄症(MS)+大動脈弁閉鎖不全症(AR) 僧帽弁閉鎖不全症(MR)+大動脈弁閉鎖不全症(AR) 僧帽弁狭窄症(MS)+大動脈弁狭窄(AS) 大動脈弁狭窄(AS)+僧帽弁閉鎖不全症(MR) 僧帽弁疾患+三尖弁閉鎖不全(TR)
虚血性心疾患	以下の疾患 (既往歴含む) <ul style="list-style-type: none"> ・狭心症 ・心筋梗塞

心電図所見	<p>以下の疾患 (既往歴含む)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・虚血性変化 ・房室ブロック < A - Vブロック > (度以上) ・WPW症候群 ・左脚ブロック ・心房細動 ・右房負荷 (右軸偏位、右室肥大、完全右脚ブロックなどの所見を伴うもの) ・左房負荷 (左室肥大などの所見を伴うもの) ・右室肥大 (右軸偏位、完全右脚ブロックなどを伴うもの) ・左室肥大 (左軸偏位、完全左脚ブロックなど、虚血性心筋障害を伴うもの) ・洞不全症候群 ・人工ペースメーカー (ペースメーカー植え込み) ・上室性頻拍症 ・非発作性頻拍症 (房室結合型、心室性) ・心室性期外収縮 (頻発性 (> 10個 / 分)、多源性のもの、連発性) ・心筋梗塞 ・虚血性ST低下の疑い ・虚血性心筋障害 (ST下降、T異常、U異常、異常Q) ・発作性頻拍症 ・Brugada 症候群
不整脈	治療を要する不整脈がある場合または不整脈の既往歴 (治療歴) がある場合
動脈疾患	<p>以下の既往のあるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・閉塞性動脈硬化症 ・胸部大動脈瘤
心膜疾患	心膜炎の既往のあるもの
心筋疾患	<p>心筋症の既往のあるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・肥大型心筋症 ・拡張型心筋症 ・拘束型心筋症 ・不整脈原性右室心筋症