

非血縁者間骨髄採取認定施設

採取責任医師各位

麻酔責任医師各位

輸血責任医師各位

公益財団法人 日本骨髄バンク
ドナー安全委員会

骨髄採取マニュアル<輸血担当医師の見地から>一部変更について(通知)

平素より骨髄バンク事業の推進に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、当法人の骨髄採取マニュアル「輸血担当医師の見地から」を一部改訂したことを通知いたします。つきましては内容をご確認の上、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 骨髄採取マニュアル 輸血担当医師の見地から 一部変更について

(1) 変更の背景

一般社団法人日本自己血輸血・周術期輸血学会「貯血式自己血輸血実施指針(2020)-予定手術を行う成人を対象とした原則-」が改訂されたため。

(2) 主な変更点

P38 (4) 採血手技

②発熱、頭痛、下痢、食欲不振など気分がすぐれない時、抜歯後3日以内の場合などは自己血採血を延期する。

※新旧対照表 参照

(3) 掲載URL

骨髄採取マニュアル 輸血担当医師の見地から

https://www.jmdp.or.jp/documents/file/04_medical/f-up02d-202203.pdf

(4) 参考資料

日本自己血輸血学会 自己血輸血 実施指針・基準

http://www.jsat.jp/jsat_web/ki_jun/index.html

以上

骨髓採取マニュアル 輸血担当医師の見地から (2022/3/30)
新旧対照表

P38 (4) 採血手技 追加について

旧	新
②発熱、頭痛、下痢、食欲不振など気分がすぐれない時は自己血採血を延期する。	②発熱、頭痛、下痢、食欲不振など気分がすぐれない時、 <u>抜歯後3日以内の場合などは自己血採血を延期する。</u>
④皮膚消毒 ヨード過敏症の人には、ポピドンヨードの代わりに <u>0.5%グルコン酸クロルヘキシジンアルコール</u> を用いる。	④皮膚消毒 ヨード過敏症の人には、ポピドンヨードの代わりに <u>1.0%クロルヘキシジングルコン酸エタノール液</u> を用いる。