

3 副作用・合併症発現状況 [回答数2,117] (2011年3月～2024年3月末までの集計)

■自覚・身体所見

	G-CSF投与3日目				採取当日				退院時				退院後			
	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤
発熱	66				40		1		30				5			
疲労	190	6			161	9			197	5			62	8		
不眠	130	13	1		103	13			63	10			15	1		
めまい	6				8				9				13	3	1	
食欲不振	11	9			11	8			16	6			8	1		
悪心	18	7			6	6			21	2			6			
嘔吐	4	5	1		2	3			2				2			
皮疹	12	1			8	2			16	5			11	4		
注射部位の反応	16				16				21	1			9			
脾腫	10				17				21				2			

■疼痛

	G-CSF投与3日目				採取当日				退院時				退院後			
	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤
背部	194	13			178	10	1		82	2			12			
骨痛	259	27			226	21	1		125	4			4			
頭痛	244	18			210	19	3		126	4			15	3		
腰痛	1015	83	1		827	71	2		469	17	1		24	3	1	
上肢	50	1			32	4			60	5			19	1		
下肢	111	6			104	11	1		51	4			13	3		
頸部	61	3			46	4			21	1			5	3	1	
喉	10				6		1		9				3			